

# Information inför gastroskopi

Gastroskopi görs för att undersöka matstrupen, magsäcken och övre delen av tunntarmen. Vid denna undersökning kan vi se om det finns några sjukliga förändringar och vid behov kan vi även ta vävnadsprov för mikroskopisk analys. En sådan provtagning i samband med undersökningen är smärtfri och ofarlig.

## Inför undersökningen

För att vi ska kunna genomföra undersökningen måste magsäcken vara tom.

**Du ska därför inte äta sex timmar före undersökningen.** Du får däremot dricka klara drycker (så som vatten, saft, te och kaffe) fram till 2 timmar innan undersökningen och det går bra att ta eventuella morgonmediciner.

Om du har insulinbehandlad diabetes kontakta mottagningen där du behandlas för råd inför kommande fasta och medicinering.

## Undersökningen

Vid undersökningen används ett mjukt instrument i form av en böjlig slang, ett gastroskop. Gastroskopet förs ned genom svalget och sen vidare genom din matstrupe, magsäck samt in i den övre delen av tunntarmen. Om du önskar blir du bedövad med en bedövningsspray i svalget för att minska reflexerna du har där.

Själva undersökningen tar i normalfall cirka 5 minuter, besöket i sin helhet är beräknat att ta 20 minuter.

## Efter undersökningen

Har du fått bedövningsspray i svalget ska du inte äta eller dricka förrän du känner att bedövningen släppt, vilket tar cirka en timme. Annars finns en risk att du sväljer fel.

Läkaren kommer att prata med dig om resultatet av undersökningen innan du går hem. Ett skriftligt svar på undersökningen kommer att skickas till din inremitterande läkare. Om vävnadsbitar skickats för mikroskopisk undersökning kommer du att få svar via brev hem till dig inom 6–8 veckor.

Om akuta problem skulle uppstå efter undersökningen, om du exempelvis får feber, buksmärta, kräkning eller blödning ska du kontakta ditt närmaste akutsjukhus.