

Gastroskopi i narkos

Vid en gastroskopi undersöks matstrupe, magsäck och tolvfingertarm med hjälp av ett endoskop. Om du har besvär med exempelvis smärta eller obehag i magen kan en gastroskopi vara en del av utredningen. Vid undersökningen är det möjligt att se om det exempelvis finns sår eller inflammation. Det är även möjligt att ta vävnadsprover från slemhinnan.

Förberedelser

Inför undersökningen måste du vara helt fastande i 6 timmar.

Detta innebär att du inte får äta eller dricka under denna period. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner för att säkerställa att magsäcken är tom vid undersökningstillfället.

Hur går undersökningen till?

Du hämtas in på rummet av narkospersonalen. En perifer venkateter sätts i din arm och du får lägga dig på vänster sida. Ett bitmunstycke placeras i din mun för att skydda endoskopet och du får en syrgasgrimpa i näsan. Därefter ges ett läkemedel som gör att du somnar.

När du har somnat för endoskopisten in endoskopet via din mun och inspekterar matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Undersökningen tar ungefär 3–4 minuter.

Efter undersökningen

Efter undersökningen vaknar du direkt och får hjälp att gå ut till ett vilorum. Du kan känna dig omtöcknad en stund efteråt, detta brukar vara i ungefär 20–30 minuter.

När du är helt vaken får du besked om undersökningresultatet av endoskopisten och du kan därefter gå hem. Du kan äta och dricka som vanligt direkt efter undersökningen.

Om vävnadsprover tas skickas dessa för mikroskopisk analys. Analysen kan ta upp till 12 veckor.

Observera att du inte får köra bil under resterande del av dagen.

Eftersom du skall genomgå undersökningen i narkos måste magsäcken vara helt tom. Därför måste du sluta äta och dricka 6 timmar innan undersökningen.